

۱۰ جلسه‌ی دهم

در جلسه‌ی قبل ثابت کردیم که درباره‌ی اعداد حقیقی جمله‌ی اول در زیر درست است ولی جمله‌ی دوم نادرست:

$$\forall n \in \mathbf{N} \quad \exists r \in \mathbf{R} \quad 0 < r < \frac{1}{n} . \text{۱}$$

$$\exists r \in \mathbf{R} \quad \forall n \in \mathbf{N} \quad 0 < r < \frac{1}{n} . \text{۲}$$

گفته‌یم که جمله‌ی دوم در بالا همان ویژگی ارشمیدسی است.

ویژگی ارشمیدسی:

$$\bigcap_{n \in \mathbf{N}} (0, \frac{1}{n}) = \emptyset$$

سوال ۱۱۳. آیا $P(A \cup B) = P(A) \cup P(B)$

پاسخ. در زیر نشان داده‌ایم که حکم بالا برقرار نیست، هر چند عبارت ۱ در پایین برقرار است. نخست ثابت می‌کنیم که

$$\textcircled{1} \quad P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B)$$

عبارت بالا را با روش استنتاجی زیر ثابت می‌کنیم:

$$1 \quad c \in P(A) \cup P(B) \rightarrow c \in P(A) \vee c \in P(B)$$

$$2 \quad c \in P(A) \rightarrow c \subseteq A$$

$$3 \quad A \subseteq A \cup B$$

$$4 \quad c \in P(A) \rightarrow c \subseteq A \cup B \quad 2, 3$$

$$5 \quad c \in P(B) \rightarrow c \subseteq A \cup B \quad \text{با به } 2 \text{ و } 3 \text{ برای } B$$

$$6 \quad c \in P(A) \vee c \in P(B) \rightarrow c \subseteq A \cup B \quad 5$$

$$7 \quad c \in P(A) \cup P(B) \rightarrow c \in P(A \cup B).$$

حال فرض کنید $\exists c \in P(A) \cup P(B)$. آنگاه $c \subseteq A \cup B$. می‌خواهیم بینیم که آیا $c \in P(A \cup B)$ است. داریم:

$$** \quad c \in P(A) \cup P(B) \leftrightarrow c \in P(A) \vee c \in P(B)$$

$$\leftrightarrow c \subseteq A \vee c \subseteq B$$

سوال ۱۱۴. آیا $c \subseteq A \cup B \rightarrow (c \subseteq A) \vee (c \subseteq B)$

حکم بالا غلط است. مثال نقض:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$A = \{1, 2\} \quad B = \{3, 4\}$$

$$c = \{2, 3\}$$

بنابراین این حکم که

$$P(A \cup B) = P(A) \cup P(B)$$

غلط است. \square

۱.۱۰ ادامهی خانواده‌ها

مثال ۱۱۵. حاصل

$$\bigcup_{k \in \mathbf{N}} (k, k+1]$$

را بیابید:

$$\begin{aligned} \bigcup_{k \in \mathbf{N}} (k, k+1] &= (\cdot, 1] \cup (1, 2] \cup (2, 3] \cup \dots \cup (k, k+1] \cup \dots \\ &= (\cdot, \infty) = \{x \in \mathbf{R} | x > \cdot\} \end{aligned}$$

مثال ۱۱۶.

$$\textcircled{1} \quad \bigcap_{k \in \mathbf{N}} (-\frac{1}{k}, \frac{1}{k})$$

$$\textcircled{2} \quad \bigcap_{k \in \{1, 2, \dots, n\}} (-\frac{1}{k}, \frac{1}{k}) = (-1, 1) \cap (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \cap (-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}) \cap \dots \cap (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$$

نخست نشان می‌دهیم $\textcircled{1}$ مجموعه‌ی تهی است: توجه کنید که

$$x. \in \bigcap_{k \in \mathbf{N}} (-\frac{1}{k}, \frac{1}{k}) \rightarrow \forall k \in \mathbf{N} \quad x. \in (-\frac{1}{k}, \frac{1}{k})$$

$$\rightarrow \star \quad \forall k \in \mathbf{N} \quad -\frac{1}{k} < x. < \frac{1}{k}$$

فرض کنید $0 < x.$. از \star نتیجه می‌گیریم که

$$\forall k \in \mathbf{N} \quad 0 < x. < \frac{1}{k} \quad \text{بنا به ویژگی ارشمیدسی} \not\rightarrow$$

اگر $0 < x.$ آنگاه

$$\forall k \in \mathbf{N} \quad -\frac{1}{k} < x. < 0$$

$$\rightarrow \forall k \in \mathbf{N} \quad 0 < -x. < \frac{1}{k} \quad \text{بنا به ویژگی ارشمیدسی} \not\rightarrow$$

همچنان توجه کنید که حاصل $\textcircled{2}$ مجموعه‌ی $(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ است.

مثال ۱۱۷. قضیه‌ی (دمورگان) $(\bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma)^c = \bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma^c$ را ثابت کنید.

اثبات. می‌خواهیم ثابت کنیم که

$$\underbrace{(\bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma)}_C^c = \bigcap_{\gamma \in \Gamma} \underbrace{A_\gamma^c}_D$$

مسیر اثبات به صورت زیر است:

$$\begin{aligned} x. \in C &\Leftrightarrow x. \in (\bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma)^c \\ &\Leftrightarrow x. \notin \bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma \Leftrightarrow \forall \gamma \in \Gamma \quad (x. \notin A_\gamma) \\ &\Leftrightarrow \forall \gamma \in \Gamma \quad x. \in A_\gamma^c \Leftrightarrow x. \in \bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma^c \end{aligned}$$

□

مثال ۱۱۸. قضیه‌ی پخش‌پذیری را ثابت کنید:

اثبات پخش‌پذیری. می‌خواهیم ثابت کنیم که

$$A \cap (\bigcup_{\gamma \in \Gamma} B_\gamma) = \bigcup_{\gamma \in \Gamma} (A \cap B_\gamma)$$

مسیر اثبات به صورت زیر است:

$$\begin{aligned} x. \in A \cap (\bigcup_{\gamma \in \Gamma} B_\gamma) &\Leftrightarrow x. \in A \wedge x. \in \bigcup_{\gamma \in \Gamma} B_\gamma \\ &\Leftrightarrow (x. \in A) \wedge (\exists \gamma. \in \Gamma \quad x. \in B_\gamma.) \\ &\qquad \text{از } (x. \in A) \wedge (x. \in B_\gamma.) \text{ نتیجه می‌گیریم که} \end{aligned}$$

$$x. \in A \cap B_\gamma.$$

از آنجا که

$$A \cap B_\gamma \subseteq \bigcup_{\gamma \in \Gamma} (A \cap B_\gamma)$$

نتیجه می‌گیریم که

$$x. \in \bigcup_{\gamma \in \Gamma} (A \cap B_\gamma)$$

پس نتیجه می‌گیریم که

$$A \cap (\bigcup_{\gamma \in \Gamma} B_\gamma) \subseteq \bigcup_{\gamma \in \Gamma} (A \cap B_\gamma)$$

حال می‌خواهیم بدانیم که آیا $\bigcup_{\gamma \in \Gamma} (A \cap B_\gamma) \subseteq A \cap (\bigcup_{\gamma \in \Gamma} B_\gamma)$ نیز برقرار است؟

$$x. \in \bigcup_{\gamma \in \Gamma} (A \cap B_\gamma) \Rightarrow \exists \gamma. \in \Gamma \quad x. \in A \cap B_\gamma.$$

$$\Rightarrow x. \in A \wedge x. \in B_\gamma. \Rightarrow (x. \in A) \wedge (x. \in \bigcup_{\gamma \in \Gamma} B_\gamma.)$$

$$\Rightarrow x. \in A \cap (\bigcup_{\gamma \in \Gamma} B_\gamma)$$

□

۲.۱۰ ضربهای دکارتی

فرض کنید A و B دو مجموعه باشند و $x \in B$ و $y \in A$. بنا به اصل جفت‌سازی $\{x, y\}$ یک مجموعه است و $\{\{x\}, \{x, y\}\}$ نیز یک مجموعه است. دوباره بنا به اصل جفت‌سازی $\{\{x\}, \{x, y\}\}$ یک مجموعه است. این مجموعه را با (x, y) نشان می‌دهیم. پس

$$(x, y) = \{\{x\}, \{x, y\}\}$$

تمرین ۱۱۹. نشان دهید که

$$(x., y.) = (x_, y_) \iff (x. = x_) \wedge (y. = y_)$$

ایده‌ای اثبات.

$$\{\{x.\}, \{x., y.\}\} = \{\{x_, y_\}\}$$

$$\{x.\} = \{x_\} \Rightarrow x. = x_$$

$$\{x_, y.\} = \{x_, y_\} \Rightarrow y. = y_$$

□

تعريف ۱۲۰. فرض کنید A و B دو مجموعه باشند. تعریف می‌کنیم:

$$A \times B = \{(x, y) | x \in A, y \in B\}$$

تمرین ۱۲۱. نشان دهید که $A \times B$ یک مجموعه است.