

۱۰ جلسه‌ی دهم

تمرین ۱۰۷. برای $\epsilon > 0$ داده شده، δ را به گونه‌ای بیابید که اگر $\delta < \delta_0$ آنگاه

$$|f(x, y) - f(0, 0)| < \epsilon$$

$$f(x, y) = \frac{y}{x^2 + 1} \quad \epsilon = 0.05 . 1$$

پاسخ.

$$f(0, 0) = 0$$

چرک‌نویس.

$$\left| \frac{y}{x^2 + 1} \right| = \frac{\sqrt{y^2}}{x^2 + 1} \leq \sqrt{y^2} \leq \sqrt{y^2 + x^2}$$

اگر $\epsilon > 0$ آنگاه اگر $\delta < \delta_0$ آنگاه

$$\left| \frac{y}{x^2 + 1} \right| < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta < \epsilon$$

برای $\epsilon = 0.05$ کافیست برای مثال $\delta = 0.005$ را در نظر بگیریم.

$$f(x, y) = \frac{y+x}{x^2 + 1} \quad \epsilon = 0.05 . 2$$

$$f(x, y) = \frac{x+y}{\sqrt{1+\cos x}} . 3$$

تمرین ۱۰۸. آیا حد زیر وجود دارد؟

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}$$

تمرین بالا را در جلسه‌ی بعد پاسخ گفته‌ایم.

تمرین ۱۰۹. نشان دهید توابع زیر در $(0, 0)$ حد ندارند.

$$f(x, y) = \frac{-x}{\sqrt{x^2 + y^2}} . 1$$

: $y = x$ پاسخ. مسیر

$$f(x, x) = \frac{-x}{\sqrt{2x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{2|x|}} = \begin{cases} x > 0 \Rightarrow \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ x < 0 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

در واقع در همان مسیر $x = y$ در از دو طرف به دو حد مختلف می‌رسیم. پس تابع مورد نظر در $(0, 0)$ حد ندارد.

$$f(x, y) = \frac{x+y}{x-y} . 2$$

پاسخ. توجه کنید که مسیر $x = y$ در این مثال، مجاز نیست زیرا این مسیر در دامنهٔ تابع قرار ندارد.

$$\begin{aligned} & :y = -x \\ f(x, y) &= \frac{x + (-x)}{x - (-x)} = 0 \\ & : (x, 0) \text{ مسیر} \\ f(x, y) &= \frac{x}{x} = 1 \end{aligned}$$

□

۱.۱۰ مشتقات جزئی

در ریاضی ۱ دیدیم که مشتق توابع تک متغیره به صورت زیر تعریف می‌شود:


$$f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$$

$$\begin{aligned} & x_0 \in Dom(f) \\ & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \end{aligned}$$

از روی مشتق، نیز «دیفرانسیل» یک تابع را به صورت زیر تعریف کردیم:

$$dy = f'(x)dx$$

در واقع اگر یک تابع مشتق پذیر باشد، آنگاه Δy را می‌توان با استفاده از dy تقریب زد:




$$\Delta y \simeq dy$$

در واقع dy تغییر ارتفاع خط مماس را نشان می‌دهد و $(y)\Delta$ تغییر ارتفاع تابع را. در جلسات آینده خواهیم دید که برای یک تابع $f(x, y) = z$ نیز می‌توان dz را تعریف کرد و dz نیز قرار است تقریبی برای $\Delta(z)$ باشد. در آنجا خواهیم دید که dz تغییر ارتفاع صفحه‌ی مماس را نشان می‌دهد و $\Delta(z)$ تغییر ارتفاع تابع را. برای رسیدن به تعریف dz به مقدماتی نیازمندیم که آنها را در این جلسه و چند جلسه‌ی آینده فراهم آورده‌ایم.

مشتق جزئی تابع $f(x, y)$ نسبت به متغیر x در نقطه‌ی $(x_., y_.) \in D$ به صورت زیر تعریف می‌شود: (در صورتی که حد زیر موجود باشد).

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_+ + h, y_+) - f(x_-, y_-)}{h}$$



۱۰.۱.۱۰ تعبیر هندسی

مشتق جزئی نسبت به متغیر x در نقطه‌ی (x_0, y_0) در واقع شیب خط مماس بر منحنی ایجاد شده در اشتراک رویه‌ی $z = f(x, y)$ و صفحه‌ی $y = y_0$ در نقطه‌ی (x_0, y_0) است (به شکل بالا نگاه کنید).

نمادگذاری

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$$

در واقع، مشتق جزئی بر حسب x در نقطه‌ی (x_0, y_0) را می‌توان به صورت زیر نیز تعریف کرد: تابع $g(x) = f(x, y_0)$ را در نظر بگیرید و مشتق این تابع را بر حسب x در نقطه‌ی x_0 محاسبه کنید. در واقع، منحنی ایجاد شده در محل تقاطع صفحه‌ی $y = y_0$ و رویه‌ی $z = f(x, y)$ دارای معادله‌ی زیر است:

$$\begin{cases} z = g(x) = f(x, y_0) \\ y = y_0. \end{cases}$$


و مشتق جزئی بر حسب x در واقع شیب خط مماس بر منحنی بالاست در نقطه‌ی (x_0, y_0) .

تعريف ۱۱۰.

$$f_y(x., y.) = \frac{\partial f}{\partial y}(x., y.) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x., y. + h) - f(x., y.)}{h}$$

در صورتی که این حد موجود باشد.

تمرین ۱۱۱. براساس شکل زیر $f_y(x., y.)$ را تحلیل هندسی کنید.



مثال ۱۱۲. مشتقات جزئی اول توابع زیر را در نقطه $(4, 5)$ محاسبه کنید.

$$f(x, y) = x^2 + 3xy + y - 1 \quad . \quad 1$$

پاسخ.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x + 3y \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(4, 5) = 23$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3x + 1 \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(4, 5) = 13$$

توجه ۱۱۳. فرض کنید $\mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$: f یک تابع دو متغیره باشد، آنگاه

$$f_x : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$$

$$(x., y.) \mapsto f_x(x., y.)$$

خود نیز تابعی دو متغیره است، و می‌توان درباره‌ی پیوستگی یا عدم پیوستگی آن در یک نقطه سخن گفت.

راه دوم.

$$f(x, 5) = x^2 + 15x + 4 \Rightarrow f_x(x, 5) = 2x + 15 \Rightarrow f(4, 5) = 23$$

توجه ۱۱۴. تا کنون فهمیدیم که اگر $z = f(x, y)$ یک تابع باشد، و $(x., y.) \in D(f)$ و قرار دهیم:

$$g(x) = f(x, y.)$$

آنگاه

$$g'(x.) = f_x(x., y.)$$

و اگر قرار دهیم

$$h(y) = f(x., y)$$

آنگاه

$$h'(y.) = f_y(x., y.)$$

□

$$f(x, y) = y \sin(xy) . ۲$$

پاسخ.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y^2 \cos(xy) \Rightarrow f_x(4, 5) = 25 \cos(20)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \sin(xy) + xy \cos(xy) \Rightarrow f_y(4, 5) = \sin(20) + 20 \cos(20)$$

□

مثال ۱۱۵. صفحه‌ی ۱ سهمی‌وار $z = x^2 + y^2$ را در یک سهمی قطع می‌کند. شب خط مماس بر این سهمی را در نقطه‌ی $(5, 2, 1)$ بیابید.


پاسخ. داریم

$$\frac{\partial z}{\partial y}(x, y) = 2y$$

مطابق آنچه گفتیم، شیب خط مماس بر منحنی محل تلاقی صفحه‌ی $x = 1$ و سهمی‌وار مورد نظر

برابر است با:

$$\frac{\partial z}{\partial y}(1, 2) = 4$$



□

توجه ۱۱۶. در مثال بالا، در صفحه‌ی $x = 1$ منحنی زیر را داریم:

$$\begin{cases} z = 1 + y^2 \\ x = 1 \end{cases}$$

$$z'(2) = 2 \times 2 = 4$$

مثال ۱۱۷. معادله‌ی خط مماس بر منحنی محل اشتراک رویه‌ی $z = f(x, y)$ و صفحه‌ی $y = y_0$ را بنویسید.

مثال بالا را در جلسه‌ی بعد حل خواهیم کرد.