

۱۲ جلسه‌ی سیزدهم، شنبه

در^۷ جلسه‌ی قبل ثابت کردیم که معادله‌ی صفحه‌ی مماس بر رویه‌ی $z = f(x, y)$ در نقطه‌ی $(x_., y_., z.)$ به صورت زیر است:

$$z - z. = \frac{\partial f}{\partial x}(x_., y_.) (x - x.) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_., y_.) (y - y.)$$

مثال ۱۲۷. معادله‌ی صفحه‌ی مماس بر سهمی‌وار بیضوی $x^2 + y^2 = z$ را در نقطه‌ی $(1, 1, 2)$ بنویسید.

پاسخ.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = 2x|_{x=1} = 2$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = 2y|_{y=1} = 2$$

$$z - 2 = 2(x - 1) + 2(y - 1)$$

□

توجه ۱۲۸. صفحه‌ی به معادله‌ی $z - z. = \frac{\partial f}{\partial x}(x_., y_.) (x - x.) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_., y_.) (y - y.)$ در واقع تقریب خطی برای تابع $f(x, y)$ حول نقطه‌ی $(x_., y_.)$ است. منظور از یک تقریب خطی، تابعی است به صورت $ax + by$. در واقع هدفمان در بحث دیفرانسیل‌پذیری این است که تقریبی به صورت $ax + by$ برای یک تابع $f(x, y)$ پیدا کنیم.

سوال ۱۲۹. آیا تقریب خطی بالا همواره تقریب مناسبی برای مقادیر تابع است؟

مثال ۱۳۰.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

تمرین ۱۳۱. نشان دهید که f_x و f_y در نقطه‌ی $(0, 0)$ پیوسته نیستند و

$$f_x(0, 0) = 0$$



^۷زحمت تایپ جزوی این جلسه را خانم شیرجی کشیده‌اند.

$$f_y(0,0) = 0$$

پس معادله‌ی (صفحه‌ی مماس) بالا به صورت زیر در می‌آید:

$$z = 0.$$

صفحه‌ی بالا تقریب مناسبی برای مقادیر تابع نیست؛ زیرا روی خط $y = x$ مقدار تابع برابر است با $\frac{1}{2}$ و با این صفحه فاصله‌ی زیادی دارد.



در واقع صفحه‌ی مماس در صورتی تقریبی مناسب برای تابع است، که تابع دیفرانسیل‌پذیر باشد.

تعریف ۱۳۲ (غیررسمی). اگر تقریب خطی یاد شده تقریب مناسبی برای مقادیر تابع حول نقطه‌ی (x_0, y_0) باشد، می‌گوییم تابع مورد نظر در نقطه‌ی (x_0, y_0) دیفرانسیل‌پذیر است.

در ادامه، به بررسی دقیق این گفته می‌پردازیم.

۱.۱۲ دیفرانسیل پذیری، مقدمه

پیش از آنکه دیفرانسیل پذیری تابع دو متغیره را توضیح دهیم، مفهوم دیفرانسیل پذیری تابع تک متغیره را مرور می کنیم. فرض کنید

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

یک تابع تک متغیره باشد. در ریاضی ۱ دیدیم که حد زیر (در صورت وجود) مشتق تابع را به دست می دهد:


$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0)$$

همچنین گفتیم که اگر $f'(x_0)$ موجود باشد آنگاه $dy = f'(x_0)dx$ دیفرانسیل تابع نامیده می شود. گفتیم که dy در واقع تقریبی برای Δy است؛ پس

$$y - y_0 \approx dy = f'(x_0)(x - x_0)$$

توجه کنید که معادله‌ی خط مماس بر تابع در نقطه‌ی x_0 به صورت زیر است (به شباهت دیفرانسیل و معادله‌ی این خط مماس توجه کنید).

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$



تعریف دقیق دیفرانسیل پذیری برای تابع تک متغیره بدین صورت است: تابع $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ را در

نقطه‌ی $x \in D_f$ دیفرانسیل پذیر می‌خوانیم هرگاه $\alpha \in \mathbb{R}$ به گونه‌ای موجود باشد که:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_+ + h) - f(x_+) - \alpha h}{h} = 0,$$

در واقع وقتی تابع دیفرانسیل پذیر است، تابع خطی αh شبیه به تابع $f(x_+ + h) - f(x_+)$ می‌شود. بیابید تابع صورت را $(h)\epsilon$ بخوانیم؛ داریم

$$f(x_+ + h) - f(x_+) - \alpha h = h\epsilon(h)$$

پس

$$f(x_+ + h) - f(x_+) = h\epsilon(h) + \alpha h$$

دقت کنید که $\epsilon(h)$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \epsilon(h) = 0$$

اگر f دیفرانسیل پذیر باشد، می‌توان ثابت کرد که $\alpha = f'(x_+)$. پس

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_+ + h) - f(x_+) - f'(x_+)h}{h} = 0.$$

۲.۱۲ تعریف دقیق دیفرانسیل پذیری (برای توابع دو متغیره)

حال می‌خواهیم مفهوم دیفرانسیل پذیری را به توابع دو متغیره تعمیم بدهیم. در بالا گفتیم که تابع تقریبی برای $f(x_+ + h) - f(x_+)$ است و دیفرانسیل به صورت αdx است. در حالت دو متغیره، تقریب خطی ما برای تابع به صورت $\alpha_1 h_1 + \alpha_2 h_2$ است.

تابع $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ را در نقطه‌ی (x_+, y_+) دیفرانسیل پذیر می‌خوانیم هرگاه $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ چنان موجود باشند که

$$\star \quad \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x_+ + h_1, y_+ + h_2) - f(x_+, y_+) - \alpha_1 h_1 - \alpha_2 h_2}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = 0.$$

^۸ معادله‌ی بالا در واقع قضیه‌ی نمو برای تابع تک متغیره است.

مطابق حال تک متغیره قرار دهید:

$$\epsilon(h_1, h_2) = \frac{f(x_+ + h_1, y_+ + h_2) - f(x_+, y_+) - \alpha_1 h_1 - \alpha_2 h_2}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}}$$

پس تابع f دیفرانسیل پذیر است هرگاه $\alpha_1, \alpha_2, \epsilon(h_1, h_2)$ موجود باشند به طوری که

$$\Rightarrow \epsilon(h_1, h_2) \sqrt{h_1^2 + h_2^2} + f(x_+, y_+) + \alpha_1 h_1 + \alpha_2 h_2 = f(x_+ + h_1, y_+ + h_2)$$

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} \epsilon(h_1, h_2) = 0$$

توجه ۱۳۳. اگر f تابعی دیفرانسیل پذیر باشد آنگاه

$$(\alpha_1, \alpha_2) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_+, y_+), \frac{\partial f}{\partial y}(x_+, y_+) \right)$$

و می‌نویسیم:

$$f'(x_+, y_+) = (\alpha_1, \alpha_2).$$

برای اثبات این نکته کافیست حد اصلی بالا (*) را روی مسیرهای $(0, h)$ و $(h, 0)$ محاسبه کنیم.

توجه ۱۳۴. تنها وجود $\frac{\partial f}{\partial y}(x_+, y_+)$ و $\frac{\partial f}{\partial x}(x_+, y_+)$ باعث دیفرانسیل پذیری نمی‌شود و باید حد نوشته شده در تعریف اصلی، صفر شود.

توجه ۱۳۵. اگر f در نقطه (x_+, y_+) دیفرانسیل پذیر باشد، آنگاه در این نقطه پیوسته است.

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} f(x_+ + h_1, y_+ + h_2) = f(x_+, y_+)$$

اثبات به عهده ی شما (از حد نوشته شده در تعریف \star کمک بگیرید)

مثال ۱۳۶.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

در این مثال f_x و f_y در $(0, 0)$ موجودند، ولی تابع در این نقطه پیوسته نیست، پس در این نقطه دیفرانسیل پذیر نیست.

مثال ۱۳۷. نشان دهید که تابع زیر در $(0, 0)$ دیفرانسیل پذیر است.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^r - y^r)}{x^r + y^r} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

پاسخ. مشتقات جزئی:

$$f_x(0, 0) = \lim_{h_1 \rightarrow 0} \frac{f(0 + h_1, 0) - f(0, 0)}{h_1} = ,$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{h_2 \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + h_2) - f(0, 0)}{h_2} = ,$$

حد دیفرانسیل پذیری:

$$\lim_{h_1, h_2 \rightarrow 0} \frac{f(0 + h_1, 0 + h_2) - f(0, 0) - \alpha_1 h_1 - \alpha_2 h_2}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}}$$

توجه ۱۳۸. اگر تابع f دیفرانسیل پذیر باشد، داریم:

$$\alpha_1 = f_x$$

$$\alpha_2 = f_y$$

$$\lim_{h_1, h_2 \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - f(x_0, y_0) - f_x(x_0, y_0)h_1 - f_y(x_0, y_0)h_2}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = ,$$

پس در مورد تابع بالا کافی است ثابت کنیم که

$$\lim_{h_1, h_2 \rightarrow 0} \frac{f(0 + h_1, 0 + h_2) - f(0, 0) - (0)h_1 - (0)h_2}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = .$$

یعنی باید ثابت کنیم که

$$\lim_{h_1, h_2 \rightarrow 0} \frac{h_1 h_2 (h_1^r - h_2^r)}{(h_1^r + h_2^r)^{\frac{r}{2}}} = .$$

باید نشان داد که

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall (h_1, h_2)$$

$$\left(\cdot < \sqrt{h_1 + h_2} < \delta \rightarrow \left| \frac{h_1 h_2 (h_1 - h_2)}{(h_1 + h_2)^{\frac{1}{2}}} \right| < \epsilon \right)$$

چرک نویس:

با توجه به $|h_1 - h_2| \leq |h_1 + h_2|$ داریم:

$$\begin{aligned} \frac{|h_1 h_2| |(h_1 - h_2)|}{(h_1 + h_2)^{\frac{1}{2}}} &\leq \frac{\sqrt{h_1} \sqrt{h_2} |h_1 + h_2|}{(h_1 + h_2)^{\frac{1}{2}}} \leq \frac{\sqrt{h_1 + h_2} \sqrt{h_1 + h_2} (h_1 + h_2)}{(h_1 + h_2)^{\frac{1}{2}}} \\ &= \sqrt{h_1 + h_2} \end{aligned}$$

با توجه به محاسبات بالا، برای هر $\epsilon > 0$ آنگاه اگر

$$\sqrt{h_1 + h_2} < \delta$$

آنگاه

$$\frac{h_1 h_2 (h_1 - h_2)}{\sqrt{(h_1 + h_2)^3}} \leq \sqrt{h_1 + h_2} < \delta = \epsilon$$

□

قضیه ۱۳۹ (قضیه‌ی نیمُو).^۹

تابع $f(x, y)$ در نقطه‌ی (x_0, y_0) دیفرانسیل پذیر است اگر و تنها اگر توابع $(\Delta x, \Delta y)$ و $\epsilon_1(\Delta x, \Delta y)$ موجود باشند بطوری که در یک همسایگی نقطه‌ی (x_0, y_0) بتوان نوشت:

$$\underbrace{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}_{=\Delta z} =$$

$$f_x(x_0, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0) \Delta y + \epsilon_1(\Delta x, \Delta y) + \epsilon_2(\Delta x, \Delta y)$$

و

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \epsilon_1(\Delta x, \Delta y) = 0$$

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \epsilon_2(\Delta x, \Delta y) = 0$$

اثبات به عهده‌ی شما.

⁹Increment

برای بررسی دیفرانسیل پذیری لزوماً از تعاریف استفاده نمی‌کیم. در قضیه‌ی زیر شرطی کافی برای دیفرانسیل پذیر بودن بیان کردہ‌ایم:

قضیه ۱۴۰. اگر f_x و f_y هردو در یک همسایگی نقطه‌ی (x_0, y_0) پیوسته باشند، آنگاه f در آن نقطه دیفرانسیل پذیر است.

مثال ۱۴۱. نشان دهید که تابع $f(x, y) = xe^{xy}$ در نقطه‌ی $(1, 0)$ دیفرانسیل پذیر است و یک تقریب خطی برای این تابع در آن همسایگی بیابید.

پاسخ.

$$f_x(x, y) = e^{xy} + xy^2e^{xy}$$

$$f_y(x, y) = x^2e^{xy}$$

تابع بالا در تمام نقاط از جمله نقطه‌ی $(1, 0)$ پیوسته‌اند. پس تابع مورد نظر دیفرانسیل پذیر است. تقریب خطی:

$$\Delta z \approx f_x(1, 0)\Delta x - f_y(1, 0)\Delta y$$

$$f_x(1, 0) = 1 + 0 = 1$$

$$f_y(1, 0) = 1$$

$$\Delta z \approx \Delta x + \Delta y \Rightarrow f(1 + \Delta x, 0 + \Delta y) \approx f(1, 0) + \Delta x + \Delta y = 1 + \Delta x + \Delta y$$

پس می‌توان نوشت:

$$f(x, y) \approx 1 + (x - 1) + (y) = x + y$$

□

تعريف ۱۴۲. اگر f دیفرانسیل پذیر باشد، دیفرانسیل کُلّی آن را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy$$

بنا به آنچه دربارهٔ معادلهٔ صفحه‌ی مماس گفتیم، دیفرانسیل کلی در واقع میزان تغییر ارتفاع

صفحه‌ی مماس را نشان می‌دهد:

